

การป้องกันโรค

โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่ป้องกันได้โดยการรักษาสุขอนามัย ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานและผู้เลี้ยงดูเด็กให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ (ก่อนและหลังเตรียมอาหาร ก่อนรับประทานอาหาร ภายหลังการขับถ่ายหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม หลังการดูดแลเด็กป่วย) ตัดเล็บให้ล้าน หลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน (เช่น ชุดนอน แก้วน้ำ หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ) และใช้ช้อนกลาง



สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ต้องจัดให้มีอ่างล้างมือและล้างมือที่ถูกสุขาลักษณะ หมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้สะอาดอยู่เสมอ รวมถึงการทำจดหมายแจ้งเด็กให้ถูกต้องด้วย

การควบคุมโรค

● **หากพบเด็กป่วย** ต้องรีบแยกเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยังเด็กคนอื่น ๆ ผู้ปกครองควรรีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดรักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรือจนกว่าจะหายเป็นปกติ ระหว่างนี้ควรล้างเกตอาการ ผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ไม่ควรพาเด็กไปในสถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สรงว่ายน้ำ ตลาด และห้างสรรพสินค้า ควรอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี ใช้ผ้าปิดมูกปากเวลาไอจาม และระมัดระวังการไอจาม รดกัน และผู้เลี้ยงดูเด็กต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง หลังสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย

● **หากมีเด็กป่วยจำนวนมาก** ผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้จัดการสถานรับเลี้ยงเด็ก ต้องดำเนินการ ดังนี้

- ปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วยหรือปิดพื้นโรงเรียนชั่วคราว (ประมาณ 5-7 วัน)
- ทำความสะอาดสถานที่เพื่อฆ่าเชื้อโรค บริเวณห้องน้ำ ห้องล้าง สรงว่ายน้ำ ครัว โรงอาหาร บริเวณที่เล่น ของเด็ก สนามเด็กเล่น โดยใช้สารละลายน้ำยาฟอกขาว (20 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 1 ลิตร) หรือน้ำยาทำความสะอาดที่ใช้ตามบ้านเรือน
- ทำความสะอาดของเล่น เครื่องใช้ของเด็กด้วยการซักล้าง แล้วผิงเผ็ดให้แห้ง
- หยุดใช้เครื่องปรับอากาศ เปิดม่านให้แสงแดดส่องให้ทั่วถึง



แจ้งการระบาดของโรค ได้ที่

- สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-1882
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ และสถานีอนามัยทุกแห่ง
- สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร 0-2245-8106, 0-2354-1836 และศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ทุกแห่ง

ติดต่อขอคำแนะนำ ได้ที่

- กรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3333
- สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทร. 0-2590-3167

โรคเมือ เท้า ปาก


Hand, Foot and Mouth Disease



สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
<http://thaigcd.ddc.moph.go.th>

โรคเมือ เท้า ปาก

เกิดจากเชื้อไวรัสลำไส้หรือเอนแทโรไวรัส หลายชนิด พบได้บ่อยในเด็กแรกและเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ในโรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์เด็กเล็ก



สถานที่ที่เล่นของเด็กใน ห้างสรรพสินค้า โดย เลขพานิชในที่อยู่ร่วมกัน อย่างแออัด จะมีโอกาสที่ เกิดการระบาดได้ โรคเกิด ประปรายตลอดปี แต่จะ เพิ่มมากขึ้นในฤดูฝน ซึ่ง อากาศเย็นและชื้น

การแพร่ติดต่อ

การติดต่อส่วนใหญ่เกิดจากได้รับเชื้อไวรัสเข้า สู่ปากโดยตรง โรคแพร่ติดต่อง่ายในช่วงสัปดาห์แรก ของการป่วย โดยเชื้อไวรัสติดมากับมือหรือของเล่น ที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรือ อุจจาระของผู้ป่วย และเกิดจากการไอจามรดกัน โดยหายใจเข้าที่แพร์คราฟจากระยะของฝอยของ ผู้ป่วย สำหรับการติดเชื้อ จากอุจจาระ จะเกิดได้ใน ระยะที่เด็กมีอาการทุเลา จนกระทั้งหายป่วย และประมาณ 1 เดือน แต่ จะเกิดขึ้นได้ น้อยกว่า



อาการของโรค

หลังจากได้รับเชื้อ 3 - 6 วัน ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดง อาการป่วย เริ่มด้วยไข้ต่ำๆ อ่อนเพลีย ต่อมอาทิตย์ 1-2 วัน มีอาการ เจ็บปาก กลืนน้ำลายไม่ได้และไม่ยอมทานอาหาร เนื่องจากมี ตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก และกระพุ้งแก้ม จะพบตุ่มหรือผื่นบุนลีแดง เล็ก (มักไม่คัน) ที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และอาจพบที่ก้นด้วย ตุ่มนี้จะกลایเป็นตุ่มพองใส บริเวณรอบ ๆ อักเสบและแดง ต่อม ตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น ๆ อาการจะทุเลาและหาย เป็นปกติ ภายใน 7-10 วัน



การรักษา

- โรคนี้ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์จะให้ยา รักษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาทาแก้ปวด ในราย มีแพลทีลินหรือกระพุ้งแก้ม

- ผู้ป่วยควรดูแลตัวเอง เพื่อลดไข้เบ็นระยะ และให้ผู้ป่วยรับประทานอาหาร อ่อน ๆ ร้อนไม่จัด ดื่มน้ำและน้ำผลไม้ และนอนพักผ่อน มาก ๆ ถ้าเป็นเด็กอ่อน อาจต้องป้อนนมให้แทนการดูด จากขวด

- ตามปกติโรคมักไม่รุนแรงและไม่มีอาการ แทรกซ้อน แต่เชื้อไวรัสบางชนิด เช่น เอนแทโรไวรัส 71 อาจทำให้มีอาการรุนแรงได้ จึงควรดูแลเด็กอย่าง ใกล้ชิด หากพบมีไข้สูง ชีม ไม่ยอมทานอาหารหรือ ดื่มน้ำ อาเจียนบ่อย ทอน แขนขาอ่อนแรง ชา ต้องรีบ พาไปโรงพยาบาลทันที เพราะอาจเกิดภาวะสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือน้ำท่วมปอด ซึ่งจะรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

